



lp	Rodzaj szczepionki	Przeznaczenie
1.	Engerix 20 mcg	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)
2.	Euvax 10 mcg	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)
3.	HBVAX PRO (WZW –B)	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)
4.	HAVRIX ADULT	Szczepionka przeciwko WZW typu A – zalecana dla dorosłych
5.	HAVRIX JUNIOR	Szczepionka przeciwko WZW typu A – zalecana dla dzieci od 1 roku życia do 18 roku życia łącznie
6.	TWINRIX ADULT	Szczepionka przeciwko WZW typu A i typu B - do uodparniania wcześniej nieuodpornionych dorosłych i młodzieży zalecana od 16 roku życia łącznie
7.	PRIORIX	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce
8.	MMR II	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dorosłych
9.	INFANRIX – IPV - HIB	- Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b zalecana dla dzieci od 2 m-ca życia - Szczepionka zalecana jako uzupełniająca u dzieci uprzednio uodpornianych DTP, polio i antygenami Hib.
10.	INFANRI XHEXA	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis (polio) i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci
11.	PENTAXIM	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b
12.	VARILRIX	Szczepionka przeciwko ospie wietrznej – zalecana dla osób zdrowych od 9 miesiąca życia, osób z grupy wysokiego ryzyka oraz osób zdrowych narażonych na bliski kontakt z chorymi na ospę wietrzną
13.	ROTARIX	Szczepionka przeciwko rota wirusom , doustna – w celu zapobiegania wystąpienia zapalenia żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanego zakażeniem rota wirusem zalecana dla niemowląt w wieku od 6 tygodni
14.	ROTATEQ	Szczepionka przeciwko rota wirusom , doustna - w celu zapobiegania wystąpienia zapalenia żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanego zakażeniem rota wirusem zalecana dla niemowląt w wieku od 6 tygodni
15.	SYNFLORIX	Szczepionka przeciwko pneumokokom – uodparnianie przeciwko chorobie inwazyjnej oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt i dzieci zalecana w wieku od ukończenia 6 tygodnia życia do 2 lat.
16.	PREVENAR	Szczepionka przeciwko pneumokokom – uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae zalecana u niemowląt i dzieci od 6 tygodnia do 5 roku życia.
17.	PNEUMO 23	Szczepionka przeciwko pneumokokom – uodpornienie przeciwko zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae (dwoinkę zapalenia płuc) zalecana dla dzieci w wieku powyżej 2 lat i osób dorosłych



18.	NEISVAC C	Szczepionka przeciwko meningokokom – uodparnianie przeciwko zakażeniom wywołanym przez <i>Neisseria meningitidis</i> (dwoinkę zapalenia opon mózgowych) zalecana dla dzieci po ukończeniu 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
19.	SILGARD	Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – odpowiedzialnego za : wystąpienie dysplazji szyjki macicy dużego stopnia, raka szyjki macicy, zmian dysplastycznych sromu dużego stopnia oraz brodawek zewnętrznych narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
20.	FSME ADULT	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - uodparnianie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu zalecana dla pacjentów powyżej 16 roku życia
21.	FSME JUNIOR	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - uodparnianie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci zalecana powyżej 1 roku życia do 16 roku życia
22.	BOOSTRIX POLIO	Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zalecana w wieku od 4 lat.
23.	BOOSTRIX	Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zalecana w wieku od 4 lat.
24.	ADACEL	Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi od 4 roku życia
25.	NIMENRIX	Szczepienie przeciw meningokokom grupy A,C,W,Y zalecana powyżej 1 roku życia
26.	IMOVAX POLIO	Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana stosowana u niemowląt, dzieci i dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawkę przypominającą

SZCZEPIENIA SEZONOWE

27.	VAXIGRIP	Szczepienie przeciwko grypie
28.	VAXIGRIP + PNEUMO 23	Szczepienie przeciwko grypie połączone ze szczepieniem przeciwko pneumokokom – zalecana dla osób w wieku powyżej 65 roku życia oraz dzieciom powyżej 2 lat